

Till skillnad från blockerande behandling, som stoppar anfallet, är profylaktisk behandling (även benämnd förebyggande behandling) inte en enstaka behandling. Den är avsedd att minska migränanfallens antal och styrka. Om behandlingen visar sig vara effektiv efter 3 månaders daglig dosering (åtminstone 50% minskning av antalet anfall), ska den fortsätta i sex månader till ett år och sedan minskas gradvis innan den avbryts. Den kan återupptas om antalet anfall ökar igen. Den kan också åtföljas av icke-medicinska åtgärder, såsom: avslappning, idrottsträning och att styra faktorer som utlöser ett anfall.

X har studerats i stora kliniska program med mer än 1700 migränpatienter och har påvisats vara förebyggande mot migrän. Profylaktisk behandling rekommenderas om:

- Dina migränanfall kommer tätt och/eller är intensiva och hindrar dig i ditt familjeliv, sociala umgänge och arbetsliv.
- Du har mer än 3 migränanfall per månad eller du har genomgått ett stort antal (6 till 8 doser per månad) blockerande behandlingar under de tre senaste månaderna.
- Akut medicinering är ineffektiv eller du inte tål det eller har avrått från det.

Dosen kan ökas om din läkare anser det nödvändigt.

Ändra inte ordinationen på eget bevåg eftersom detta kan påverka din behandling negativt.

Hur du använder **X** som förebyggande behandling mot migrän:

Startdosen är liten och ska steg för steg ökas till underhållsdosen. Underhållsdosen är vanligen 100 mg, fördelat på två doser, morgon och kväll. **X** kan tas utan hänsyn till måltider. Den aktiva föreningen, topiramate, har en bitter smak. Att dela eller krossa tabletter rekommenderas inte. **X** finns i olika styrkegrad: 15 mg, 25 mg, 50 mg. Följ din läkares doseringsanvisning. Berätta alltid för din läkare om annan sjukdom och medicinering. Vissa mediciner kan förändra verkan hos **X**. **X** påverkar inte effekten av preventivmediciner som är vanliga i förebyggandet mot migrän.